

ՄԱՍԻՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ ԵՎ ԿՐԾԻ ԽՆԱՄՔ

Մասփիսների բուժումը յուրաքանչյուր ֆերմերի համար ավելի ծախսաւարար է, քան կանխարգելումը:

Մասփիսների կանխարգելման համար պէտք է՝

- պահպանել գոմի և կթի սրահի սանիտարա-հիգիենիկ պայմանները
- կատարել ճիշտ ցամաքեցում
- պահպանել կթից առաջ և դրա ընթացքում ձեռքերի, կթի ագրեգատի և կրծի մաքրությունը
- կթից առաջ կապարել կրծի մերսում ներքևից վերև ուղղությամբ
- կապարել ճիշտ կիթ (բռնցքակիթ), և կուրծը դափարկել մինչև վերջ
- մասփիսով հիվանդ կովերին կթել ամենավերջում
- կթից հետո կուրծը մշակել ախտահանիչներով/ սովերեն/
- կթից հետո հնարավորության սահմաններում կենդանուն պահել կանգնած վիճակում 30-40 րոպե
- պարբերաբար ստուգել կաթը մասփիսի կալիֆորնիական թեստով /դիմելով անասնաբույժին /
- ժամանակին և ճիշտ բուժել կրծի և պտուկների հետ կապված այլ ախտահարումները:

Միայն է մարնակիթը և թրջած ձեռքերով կթելը, քանի որ վնասվում են պրկային խողովակների լորձաթաղանթը, իսկ խոնավության միջոցով միկրոբները հեշտությամբ անցնում են կուրծ:

Կրծի մաքրության պահպանման համար պէտք է՝

- սափրելով հեռացնել կրծի մազերը
- կթից 15-20 րոպե առաջ լվանալ կուրծը գոլ ջրով և չորացնել (գոյություն ունեն հափուկ չոր և թաց ախտահանիչ անձեռոցիկներ):



Քանի որ կթից հետո պտուկների անցքերը մնում են բաց, և միկրոբների ներթափանցման համար պայմաններ են ստեղծվում, ուստի կթից հետո կովերին պէտք է պահել կանգնած վիճակում 30-40 րոպե, ինչպես նաև պտուկներին քսել ախտահանիչներ, օրինակ՝ **սովերեն**

Սովերենը իրենից ներկայացնում է յոդի և գլիցերինի թանձր խառնուրդ, որն ապահովում է՝

- պտուկների փափկությունը և էլաստիկությունը
- պտուկների մաշկի ամբողջականության արագ վերականգնումը
- պտուկների վրա պաշտպանիչ շերտի գոյացում, որը կանխում է մանրէների ներթափանցումը, ինչի շնորհիվ էլ կանխվում են մաստիտները:




Օգտագործման եղանակը՝

1 մաս խրանյութը նոսրացնել 4 մաս ջրով, և ամեն կթից հետո պտուկները ընկղմել այդ հեղուկի մեջ:

Զգուշացում՝

Նոսրացումը խախտելու դեպքում հնարավոր են այրվացքներ



Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

