

ՊԻՐՈՊԼԱՉՄՈՋԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ

Շատ տարածված արյունամակարուծային հիվանդություն է, որն արտահայտվում է տենդով, լորձաթաղանթների և մաշկի դեղնությամբ, սակավարյունությամբ, տարբեր օրգանների գործունեության խանգարումներով և այլն:

ՀԱՍՏՐԱԾ ՎՆԱՄՆԵՐԸ`

- մեծ թվով անկումներ (մինչև 30%)
- վիժումներ և անպտղություն
- մթերատվության նվազում

Հարուցիչի յուրահատուկ փոխանցողներ են հանդիսանում *Boophilus calcaratus* և այլ տզերը:

Հիվանդությունը հիմնականում նկատվում է արտաային շրջանում`

- առաջին բռնկումը լինում է հիմնականում մարտ-ապրիլ ամիսներին
- երկրորդը` մայիսին
- երրորդը` հունիս-հուլիսին
- չորրորդը` սեպտեմբեր-հոկտեմբերին




ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Կենդանիներին արոտ հանելուց առաջ պետք է մշակել հակատզային նյութերով: Տողարկումները կրկնել ամբողջ արոտային շրջանի ընթացքում ամիսն առնվազն մեկ անգամ:

Տզեր հայտնաբերելու դեպքում կատարել դրանց հեռացում:

Վերոնշյալ միջոցատուները իրականացնել ԲԱՑԱՌ-ԱՊԵՍ անասնաբույժի հսկողությամբ:



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Cooperation Office
South Caucasus

SDA Strategic Development Agency
Strategies for Development