

Հիվանդության անվանումը	Մահմանափակման ավարտի ժամկետը	Տարածքի ախտահանությունների իրականացման հաճախականությունը	Արդյունավետ ախտահանիչները և օգտագործման եղանակները	Բուժման արդյունավետությունը
Դաբաղ	Վերջին հիվանդ կենդանին առողջանալուց կամ սասկելուց 21 օր անց	Ամեն օր՝ մինչև հիվանդության վերացումը	Կաուստիկ սոդա 2%-ոց տաք լուծույթ (20 գրամ կաուստիկ սոդային ավելացնել 980մլ տաք ջուր) <i>կամ</i> 2.5%-ոց ֆորմալինի լուծույթ 25 մլ ֆորմալինին ավելացնել 975 մլ ջուր	Բուժվում է: մահացությունը 0.2-0.5% (բարորակ ձևի դեպքում) և 70-100% (չարորակ ձևի դեպքում)
Խշխշան պալար	Վերջին հիվանդ կենդանին առողջանալուց կամ սասկելուց 14 օր անց	Ամեն օր, մինչև հիվանդության վերացումը	10%-ոց ֆորմալինի լուծույթ 10%-ոց կաուստիկ սոդայի տաք լուծույթ	Հաճախ արդյունավետ չէ
Բրուցելյոզ	2 ամսվա մեջ 2 բացասական արդյունք ստանալուց հետո	Յուրաքանչյուր հիվանդության դեպք արձանագրվելուց, յուրաքանչյուր վիժումից, արյուն վերցնելուց հետո	5%-ոց ֆորմալինի 5%-ոց կաուստիկ սոդայի լուծույթներով	Արդյունավետ չէ
Տուբերկուլյոզ	Մինչև ստացվի բացասական արդյունք	Յուրաքանչյուր հիվանդության դեպք արձանագրվելուց	7.5%-ոց ֆորմալինի, 3%-ոց կաուստիկ սոդայի լուծույթներով	Արդյունավետ չէ
Միքրախտ	Վերջին հիվանդ կենդանին առողջանալուց կամ սասկելուց 15 օր անց	Օրը 3 անգամ, մինչև հիվանդության վերացումը	7.5%-ոց ֆորմալինի 3%-ոց կաուստիկ սոդայի լուծույթներով	Կարելի է բուժել: մահացությունը 80-100%
Պաստերելյոզ	Վերջին հիվանդ կենդանին առողջանալուց կամ սասկելուց 14 օր անց	10 օրը մեկ անգամ	1.25%-ոց ֆորմալինի, 2%-ոց կաուստիկ սոդայի լուծույթներով	Բուժվում է
Տրիխոֆիտոզ	Վերջին հիվանդ կենդանին առողջանալուց կամ սասկելուց 21 օր անց	Ամեն օր՝ մինչև հիվանդության վերացումը	1%-ոց կաուստիկ սոդայի, 2%-ոց ֆորմալինի, ֆորմալին-կերոսինային (որը բաղկացած է 10 մաս ֆորմալինից և տաս մաս կերոսինից) լուծույթներով:	Բուժվում է

*** 10քմ. Տարածքի համար պետք է մոտ 3-4լ. ախտահանիչ լուծույթ